

교직원 여러분!

결핵 의심 기준, 알고 계신가요?



결핵은 조기에 발견하고 치료하면 완치가 가능합니다.

우리 학생과 동료 교직원의 건강을 위해 결핵 의심 증상 기준을 꼭 알아두세요!

1. 결핵 의심 증상 판단표

구분	세부 내용	확인 포인트
기침	2주 이상 지속되는 기침	감기약 복용 후에도 호전되지 않음
객담(가담)	가담이 동반되는 기침, 혈담	가담에 피가 섞여 나오는 경우 즉시 의뢰
발열	미열이 지속되거나 원인 불명의 발열	특히 오후~저녁에 반복되는 미열
야간발한	자다가 식은땀에 젖어 깨는 증상	옷이나 이불이 젖을 정도의 발한
체중감소	특별한 이유 없이 체중이 감소	최근 1~2개월 내 뚜렷한 체중 변화
흉부 X선 이상	건강검진 등에서 폐 침윤·공동 소견	검진 결과지에 '재검' 또는 '정밀검사' 표기

※ 위 증상에 해당 시 결핵 의심자로 분류하고 보건실에 즉시 보고한다.

2. 결핵 의심 대상자 발견 시

- ✓ 결핵은 공기 중 비말핵으로 전파되는 호흡기 감염병으로, 초기 발견 시 완치가 가능합니다.
- ✓ 담당 교직원은 학생 상담·출결 관리 과정에서 위 의심 증상을 인지하면 즉시 보건실에 연계한다.
- ✓ 의심 학생 발견 시 개인 낙인·소문 확산을 방지하기 위해 상담 내용은 비밀을 철저히 보장한다.

결핵 의심 증상 주요 체크 포인트



2주 이상 기침



가래(객담)



발열



야간발한



체중감소



흉부 X선 이상



결핵이 의심되면 지체하지 말고 보건실로 연계해주세요.
조기 발견·조기 치료가 본인과 우리 모두의 건강을 지킵니다!

